

体液清理程序

呕吐物和腹泻物等体液中含有诺如病毒，可传播达 25 英尺，污染表面和食物，给消费者和员工带来风险。正确清理呕吐物和腹泻物需要比常规清洁更严格的方法，才能有效减少诺如病毒的暴露风险。制定应对计划并使用适当物品进行有效清洁和消毒，对保护您的员工和顾客至关重要。

第一步：

- 疏散 25 英尺范围内的所有人。
- 封锁通往污染区域的通道。
- 穿上个人防护设备。清理呕吐物或腹泻物的人员至少应戴一次性手套和口罩。
- 处理该半径范围内未盖盖的食物和一次性物品。
- 清洗、冲洗并消毒该区域内的所有餐具和设备。



用于清理：

- 立即使用防护服和纸巾清除呕吐物或腹泻物，清理顺序应由清洁区至污染区。
- 使用猫砂或小苏打吸收地毯上的液体。
- 将所有废物装入塑料袋处理，并清洗或丢弃受污染的布制品
- 用肥皂水清洗受影响的表面，冲洗并擦干。清洁并消毒所有可重复使用的工具。
- 用氯漂白剂溶液消毒表面，配比为每加仑水加入 $\frac{3}{4}$ 杯浓缩漂白剂或 1 杯普通漂白剂。
- 用喷雾瓶喷洒消毒液，确保表面保持湿润至少 5 分钟
 - 对于地毯和室内装潢，建议使用蒸汽清洗。
 - 用清水冲洗所有与食物接触的表面，并用肥皂彻底洗手，因为洗手液对诺如病毒无效。